LE MIEL EN MATERNITE : ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES ET PRATIQUES

Martin Anne-Sophie[1], Bloch Adrien[1], Perrinet Marie[1], Bourdon Olivier[1,2]

[1] Pharmacie à usage intérieur, Hôpital Robert Debré, 75019 Paris; [2]Faculté de Pharmacie, Université de Paris 75006 Paris

F-PCL-17

A l'hôpital, dans le service d'obstétrique, le miel stérile est **un dispositif médical** utilisé dans **le traitement des crevasses mammaires post allaitement**, alors même que l'utilisation du **miel non stérile chez l'enfant < 1 an est interdite** : risque de **botulisme infantile**.
Il existe un risque de confusion d'utilisation entre le miel alimentaire et le miel stérile et un risque d'ingestion pour les bébés.

→Nous avons donc enquêté à l'hôpital et en officine sur l'utilisation du miel et les connaissances des professionnels de santé à son sujet.

***Objectif** : Etats des lieux des connaissances sur l'utilisation du miel stérile et pratiques Ville-Hôpital.*

Matériel & Méthodes

Enquête réalisée en juin-juillet 2018

Questionnaire 1 : Service d'obstétrique

- **Fréquence d'utilisation du miel**
- **Forme (stérile ou alimentaire)**
- **Première intention ?**
- **Avantages / Inconvénients**
- **Conseils associés**
- **Prescription de sortie**

Connaissance du risque de botulisme en cas d'ingestion du miel alimentaire par les nouveaux nés?

Questionnaire 2 : Officine

- **Fréquence de demande de traitement pour les crevasses mammaires**
- **Traitements proposés (miel, autre)**
- **Conseils associés**

Connaissance du risque de botulisme en cas d'ingestion du miel alimentaire par les nouveaux nés?

RESULTATS

36 professionnels **Sages femmes, médecins, infirmières, auxiliaires puéricultrices**	**38 professionnels** **Pharmaciens, préparateurs**
100% d'utilisation du miel stérile dans le traitement des crevasses	57,9% confrontés à des questions sur le traitement des crevasses (2,2 fois/mois)
42,7% de prescription en première intention	77,3% délivrent des conseils et des produits mais jamais de miel
39% de conseils les mamans à propos de la non utilisation du miel alimentaire chez le nouveau né	Aucun ne connait l'utilisation du miel dans les crevasses
Echantillons donnés à la sortie du service	Aucun n'a de miel stérile en stock
42,1% de connaissance du risque de botulisme infantile en cas d'ingestion de miel alimentaire par les nouveaux nés	**13,2%** de connaissance du risque de botulisme infantile en cas d'ingestion de miel alimentaire par les nouveaux nés

Conclusion – Discussion :

Manque d'information des patientes et des soignants

↓

Risque d'utilisation du miel alimentaire au retour au domicile

↓

Nécessité d'informer les équipes soignantes et les mamans

↓

Création d'un dépliant à destination des patientes

Plaquette d'information, format dépliant, rassemblant les messages clés

Journées Franco Suisses de Pharmacie Hospitalière – 5 et 6 décembre 2019