Une **gestion optimisée** des facteurs de coagulation permet d'économiser > **170 000 CHF** sur 1 an

Impact économique de l'optimisation de la gestion des médicaments onéreux à l'hôpital : exemple des facteurs de coagulation

Marion Duwez[1], Cyril Stucki[1], Nicolas Fourquet[3], Gabriele Martin[4], Veneranda Mattiello[4], Françoise Boehlen[5], Pierre Fontana[5], Pascal Bonnabry[1,2]

[1]Service de pharmacie, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), [2] Section des sciences pharmaceutiques, Université de Genève, Université de Lausanne, [3]Service des urgences adultes, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), [4]Service d'oncohématologie pédiatrique, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), [5]Service d'angiologie et d'hémostase, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) GENEVE

Objectifs

- **Optimiser l'usage** du médicament et son **économicité** : «Smarter-Drugs»
- Réduire les pertes financières liées aux périmés

Conclusions

- **Economies directes** par la gestion pharmaceutique des stocks de molécules onéreuses (ex : FDC[1])
- Limitation du gaspillage par la **revalorisation des produits périmés** auprès des fournisseurs

Méthodes

Collaboration interprofessionnelle
Pharmacien
Prescripteurs
Infirmiers

Optimisation liste FDC[1] stockés et quantités

Pharmacien

Gestion stock FDC[1] hebdomadaire
Gestion des périmés

Pharmacie centrale

Hémostase

Urgences Adultes

Pédiatrie

[1] Facteurs de coagulation VIII, IX, von Willebrand, XIII, VII activé, complexe prothrombique activé

Résultats

42 références FDC[1] en stock

Gestion optimisée par un **pharmacien**

Collaboration interprofessionnelle

27 références FDC[1] en stock

Valeur financière de stock
- 13%
(- 37 000 CHF)

Juin 2018 — Novembre 2018 — Juin 2019

Economie directe annuelle
> 170K CHF

Marchandise périmée
⇒ 20 références
⇒ 188 245 CHF[2]

OPTIMISATION

Fournisseurs
Valorisation des périmés acceptée (n=8/9)

91% revalorisé[3]

Notes de crédit (166 300 CHF)

Echange de marchandise (4 330 CHF)

Stock de consigne créé pour 3 FDC[1] (Feiba®, Obizur®, Ceprotin®)

[2]Stock de sécurité nécessaire pour notre centre de référence en hémostase, qui peut ne pas être consommé avant péremption
[3]Périmés traités sous 25j après péremption en moyenne par le pharmacien

Hôpitaux Universitaires Genève
ISPSO INSTITUT DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES DE SUISSE OCCIDENTALE
F-LOG-7
22èmes Journées Franco-Suisses de Pharmacie Hospitalière
Lausanne - 5 et 6 décembre 2019
Authors declare no conflict of interest