

Impact de recommandations locales sur la qualité du traitement médicamenteux après infarctus dans un hôpital régional

Vera von Gunten¹, Christophe Sierro², Séverine Pernoux¹, Marie-Laure Weibel¹, Pierre-Auguste Petignat³, Grégoire Girod², Johnny Beney¹

¹Pharmacie, Hôpital du Valais - Institut Central, ²Cardiologie, Hôpital du Valais - CHCVs,

³Médecine interne, Hôpital du Valais - CHCVs, Sion, Suisse

Abstract

Après un infarctus du myocarde (IM), les sociétés internationales de cardiologie recommandent un schéma de traitement optimal incluant quatre classes médicamenteuses, connu sous l'acronyme BASI (Bétabloquant, Antiplaquettaires, Statine et Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine). Cette étude montre que l'implémentation de recommandations adaptées à l'institution améliore significativement la qualité de traitement après IM dans un hôpital régional (CHCVs, Sion), augmentant de 10% la prescription de la combinaison BASI à la sortie. Les résultats détaillés sont discutés. Une mise à jour du schéma BASI utilisé dans notre institution est proposée sous forme de tableau, avec des exemples de combinaisons médicamenteuses possibles, incluant les dosages.

Published in : Rev Med Suisse 2013;9:2107-2111

http://rms.medhyg.ch/article.php?ID_REVUE=RMS&ID_ARTICLE=RMS_406_2107&AJOUT_BIBLIO=RMS_406_2107

Contact: vera.vongunten@hopitalvs.ch